

患者用クリニカルパス 【経皮経肝胆管・胆嚢ドレナージ術(PTCD・PTCCD)を受けられる方へ】

月日	/ ~ /	/	/	/	/ ~ /
経過	入院～治療前日まで	当日の治療前	当日・治療後	翌日（1日目）	2～6日目
処置					
処方 (内服)	薬を内服中の方は看護師にご提示下さい 薬の内服は主治医の指示に従って下さい	薬を内服中の方は、朝食後 服用分まで内服して下さい	治療後は、血液検査の結果により 薬の内服を再開します 		
注射		朝、点滴を開始し、 治療後まで続けます 	点滴は翌日昼まで継続します	昼頃に点滴を 一旦休みます  夕方、点滴があります	2日目も朝・夕に点滴があります (点滴は必要に応じて適宜 追加します)
検査			帰室1時間後に血液検査があります 	朝、血液検査をします 午後に、チューブ造影 の検査があります	4日目に血液検査があります 3～7日目にチューブ造影の検査 があります
観察			血圧等を定期的に測定します 		
食事		食事摂取中の方は朝食以降 絶飲食です(水分のみ許可の 出ている方は朝9時頃まで 水分は構いません)	血液検査の結果により 夕食から再開となります (治療前に水分のみ許可の 出ている方は水分摂取を再開します) 		
安静度		できるだけ病棟でお待ち 下さい	帰室後は絶対安静です (上向きのみです) 	床上安静です チューブ造影で 問題がなければ 横向きになれます	2日目より介助で座位になれます 3日目よりポッドに移動する ことができます 6日目からトイレまで歩行できます
清潔		朝の点滴開始前に、検査着 に着替えて下さい 		シャワーを使えるまでタオルで体を拭きます 	
説明 その他	医師が治療について説明します 看護師が準備等について説明します	治療は午後です 時計・義歯・指輪・ヘアピン 等ははずして下さい	医師が治療結果を説明します  看護師が治療後の注意事項 等を説明します 		

※治療及びその後の日程は現時点で予想されるものであり、変動することがありますのでご注意ください。

京都第二赤十字病院 消化器内科