がん種	レジメン名	1サイクル (日)	抗がん薬	投与量	投与日 (day)	備考
大腸癌	mFOLFOX6+Bevacizumab	14	ペバシズマブBS点滴静注	5 mg/kg	1	
			レボホリナート点滴静注	200 mg/m ²	1	
			エルブラット点滴静注	85 mg/m ²	1	
			フルオロウラシル注	400 mg/m ²	1	
			フルオロウラシル注	2400 mg/m ²	1	
大腸癌	CapeOX+Bevacizumab	21	ペバシズマブBS点滴静注	7.5 mg/kg	1	カベシタピン 1000mg/m ² /回、1日2回day1(夕)～day15(朝) 2投1休、CCr30-50 : 75%用量 (1段階減量) 30未満 : 禁忌
			エルブラット点滴静注	130 mg/m ²	1	
大腸癌	FOLFIRI+Bevacizumab	14	ペバシズマブBS点滴静注	5 mg/kg	1	
			レボホリナート点滴静注	200 mg/m ²	1	
			カンプト点滴静注	150 mg/m ²	1	
			フルオロウラシル注	400 mg/m ²	1	
			フルオロウラシル注	2400 mg/m ²	1	
大腸癌	mFOLFOX6	14	レボホリナート点滴静注	200 mg/m ²	1	
			エルブラット点滴静注	85 mg/m ²	1	
			フルオロウラシル注	400 mg/m ²	1	
			フルオロウラシル注	2400 mg/m ²	1	
大腸癌	CapeOX	21	エルブラット点滴静注	130 mg/m ²	1	カベシタピン 1000mg/m ² /回 1日2回day1(夕)～day15(朝) 2投1休、CCr30-50 : 75%用量 (1段階減量) 30未満 : 禁忌
大腸癌	FOLFIRI	14	レボホリナート点滴静注	200 mg/m ²	1	
			カンプト点滴静注	150 mg/m ²	1	
			フルオロウラシル注	400 mg/m ²	1	
			フルオロウラシル注	2400 mg/m ²	1	
大腸癌	mFOLFOX6+Cetuximab	14	アービタックス注射液	250 mg/m ²	1,8	アービタックス : 初回は400mg/m ²
			レボホリナート点滴静注	200 mg/m ²	1	
			エルブラット点滴静注	85 mg/m ²	1	
			フルオロウラシル注	400 mg/m ²	1	
			フルオロウラシル注	2400 mg/m ²	1	
大腸癌	mFOLFOX6+Cetuximab (2週毎)	14	アービタックス注射液	500 mg/m ²	1	アービタックス : 初回は400mg/m ²
			レボホリナート点滴静注	200 mg/m ²	1	
			エルブラット点滴静注	85 mg/m ²	1	
			フルオロウラシル注	400 mg/m ²	1	
			フルオロウラシル注	2400 mg/m ²	1	
大腸癌	FOLFIRI+Cetuximab	14	アービタックス注射液	250 mg/m ²	1,8	
			レボホリナート点滴静注	200 mg/m ²	1	
			カンプト点滴静注	150 mg/m ²	1	
			フルオロウラシル注	400 mg/m ²	1	
			フルオロウラシル注	2400 mg/m ²	1	
大腸癌	FOLFIRI+Cetuximab (2週毎)	14	アービタックス注射液	500 mg/m ²	1	
			レボホリナート点滴静注	200 mg/m ²	1	
			カンプト点滴静注	150 mg/m ²	1	
			フルオロウラシル注	400 mg/m ²	1	
			フルオロウラシル注	2400 mg/m ²	1	
大腸癌	mFOLFOX6+Panitumumab	14	ペクティビクス点滴静注	6 mg/kg	1	
			レボホリナート点滴静注	200 mg/m ²	1	
			エルブラット点滴静注	85 mg/m ²	1	
			フルオロウラシル注	400 mg/m ²	1	
			フルオロウラシル注	2400 mg/m ²	1	

がん種	レジメン名	1サイクル (日)	抗がん薬	投与量	投与日 (day)	備考
大腸癌	mFOLFOX6+Panitumumab (L-OHP抜き)	14	ベクティビクス点滴静注	6 mg/kg	1	
			レボホリナート点滴静注	200 mg/m ²	1	
			フルオロウラシル注	400 mg/m ²	1	
			フルオロウラシル注	2400 mg/m ²	1	
大腸癌	FOLFIRI+Panitumumab	14	ベクティビクス点滴静注	6 mg/kg	1	
			レボホリナート点滴静注	200 mg/m ²	1	
			カンプト点滴静注	150 mg/m ²	1	
			フルオロウラシル注	400 mg/m ²	1	
			フルオロウラシル注	2400 mg/m ²	1	
大腸癌	CPT-11+Panitumumab	14	ベクティビクス点滴静注	6 mg/kg	1	
			カンプト点滴静注	150 mg/m ²	1	
大腸癌	CPT-11+Cetuximab	14	アービタックス注射液	250 mg/m ²	1,8	
			カンプト点滴静注	150 mg/m ²	1	
大腸癌	CPT-11+Cetuximab (2週毎)	14	アービタックス注射液	500 mg/m ²	1	
			カンプト点滴静注	150 mg/m ²	1	
大腸癌	CPT-11	14	カンプト点滴静注	150 mg/m ²	1	
大腸癌	IRIS+Bevacizumab	28	ベバシズマブBS点滴静注	5 mg/kg	1,15	S-1 80-120mg/body 内服 経口 d1-14, CCr60-80 : 初回投与量 (必要に応じて1段階減量)、60未満: 臨床試験除外基準
			カンプト点滴静注	100 mg/m ²	1,15	
大腸癌	Panitumumab	14	ベクティビクス点滴静注	6 mg/kg	1	
大腸癌	Cetuximab (初回)	7	アービタックス注射液	400 mg/m ²	1	
大腸癌	Cetuximab (2回目以降)	7	アービタックス注射液	250 mg/m ²	1	
大腸癌	Cetuximab (2週毎)	14	アービタックス注射液	500 mg/m ²	1	
大腸癌	FOLFIRI+Ramucirumab	14	サイラムザ点滴静注液	8 mg/kg	1	
			レボホリナート点滴静注	200 mg/m ²	1	
			カンプト点滴静注	150 mg/m ²	1	
			フルオロウラシル注	400 mg/m ²	1	
			フルオロウラシル注	2400 mg/m ²	1	
大腸癌	SOX+ Bevacizumab	21	ベバシズマブBS点滴静注	7.5 mg/kg	1	S-1 80-120mg/day 1日2回day1(夕)~day15(朝) 2投1休、腎機能に応じた減量基準あり
			エルブラット点滴静注	130 mg/m ²	1	
大腸癌	IRIS	28	カンプト点滴静注	125 mg/m ²	1,15	S-180-120mg/body 内服 経口 d1-14、腎機能に応じた減量基準あり
大腸癌	SOX	21	エルブラット点滴静注	130 mg/m ²	1	S-1 80~120mg/day 1日2回 day1-14 経口、腎機能に応じた減量基準あり
大腸癌	FOLFOXIRI + Bevacizumab	14	ベバシズマブBS点滴静注	5 mg/kg	1	
			カンプト点滴静注	165 mg/m ²	1	
			エルブラット点滴静注	85 mg/m ²	1	
			レボホリナート点滴静注	200 mg/m ²	1	
			フルオロウラシル注	3200 mg/m ²	1	
大腸癌	5FU+Bevacizumab	14	ベバシズマブBS点滴静注	5 mg/kg	1	
			レボホリナート点滴静注	200 mg/m ²	1	
			フルオロウラシル注	3200 mg/m ²	1	
大腸癌	FOLFIRI+Aflibercept	14	ザルトラブ点滴静注	4 mg/kg	1	
			レボホリナート点滴静注	200 mg/m ²	1	
			カンプト点滴静注	150 mg/m ²	1	
			フルオロウラシル注	400 mg/m ²	1	
			フルオロウラシル注	2400 mg/m ²	1	
大腸癌	Cape + Bevacizumab	21	ベバシズマブBS点滴静注	7.5 mg/kg	1	カベシタピン 1000mg/m ² /回、1日2回day1 (夕) ~day15(朝) 2投1休、CCr30-50 : 75%用量 (1段階減量) 30未満: 禁忌
大腸癌	S-1 + Bevacizumab	42	ベバシズマブBS点滴静注	5 mg/kg	1,15,29	S-1 80-120mg/day 内服 1日2回day1(夕)~day29(朝) 4投2休、CCr60-80 : 初回投与量 (必要に応じて1段階減量) 60未満: 臨床試験除外基準

がん種	レジメン名	1サイクル (日)	抗がん薬	投与量	投与日 (day)	備考
大腸癌	5-FU+I-LV	14	レボホリナート点滴静注	200 mg/m ²	1	
			フルオロウラシル注	400 mg/m ²	1	
			フルオロウラシル注	2400 mg/m ²	1	
大腸癌	5-FU+I-LV+Bevacizumab	14	ベバシズマブBS点滴静注	5 mg/kg	1	
			レボホリナート点滴静注	200 mg/m ²	1	
			フルオロウラシル注	400 mg/m ²	1	
			フルオロウラシル注	2400 mg/m ²	1	
大腸癌	CPT-11 + Bevacizumab	14	ベバシズマブBS点滴静注	5 mg/kg	1	
			カンプト点滴静注	150 mg/m ²	1	
大腸癌	Nivolumab + Ipilimumab	21	オブジーボ点滴静注	240 mg/Body	1	
			ヤーボイ点滴静注	1 mg/kg	1	
大腸癌	Nivolumab (5サイクル目以降、2週毎)	14	オブジーボ点滴静注	240 mg/Body	1	
大腸癌	Nivolumab (5サイクル目以降、倍量、4週毎)	28	オブジーボ点滴静注	480 mg/Body	1	
大腸癌	Cetuximab+Encorafenib+Binimetinib (初回)	7	アービタックス注射液	400 mg/m ²	1	エンコラフェニブ:300mg/day 連日、ピニメチニブ:45mg×2/day 連日
大腸癌	Cetuximab+Encorafenib+Binimetinib (2回目以降)	7	アービタックス注射液	250 mg/m ²	1	エンコラフェニブ:300mg/day 連日、ピニメチニブ:45mg×2/day 連日
大腸癌	Cetuximab (2週毎) +Encorafenib+Binimetinib	14	アービタックス注射液	500 mg/m ²	1	エンコラフェニブ:300mg/day 連日、ピニメチニブ:45mg×2/day 連日
大腸癌	Cetuximab+Encorafenib (初回)	7	アービタックス注射液	400 mg/m ²	1	エンコラフェニブ:300mg/day 連日
大腸癌	Cetuximab+Encorafenib (2回目以降)	7	アービタックス注射液	250 mg/m ²	1	エンコラフェニブ:300mg/day 連日
大腸癌	Cetuximab (2週毎) +Encorafenib	14	アービタックス注射液	500 mg/m ²	1	エンコラフェニブ:300mg/day 連日
大腸癌	FOLFOXIRI	14	カンプト点滴静注	165 mg/m ²	1	
			レボホリナート点滴静注	200 mg/m ²	1	
			エルプラット点滴静注	85 mg/m ²	1	
			フルオロウラシル注	3200 mg/m ²	1	
大腸癌	FTD/TPI + Bevacizumab	28	ベバシズマブBS点滴静注	5 mg/kg	1,15	FTD/TPI 70mg/m ² /day、day1-5,8-12
大腸癌	Trastuzumab + Pertuzumab (1サイクル目)	21	パージェタ点滴静注	840 mg/Body	1	
			ハーセプチン注射用	8 mg/kg	1	
大腸癌	Trastuzumab + Pertuzumab (2サイクル目以降)	21	パージェタ点滴静注	420 mg/Body	1	
			ハーセプチン注射用	6 mg/kg	1	
乳癌	FEC100	21	エビルピシン塩酸塩注射用	100 mg/m ²	1	
			エンドキサン注	500 mg/m ²	1	
			フルオロウラシル注	500 mg/m ²	1	
乳癌	TC	21	ドセタキセル点滴静注	75 mg/m ²	1	
			エンドキサン注	600 mg/m ²	1	
乳癌	triweekly_Trastuzumab (初回)	21	トラスツズマブBS点滴静注用	8 mg/kg	1	
乳癌	triweekly_Trastuzumab (2回目以降)	21	トラスツズマブBS点滴静注用	6 mg/kg	1	
乳癌	triweekly_DTX+Trastuzumab (初回)	21	トラスツズマブBS点滴静注用	8 mg/kg	1	
			ドセタキセル点滴静注	75 mg/m ²	1	
乳癌	triweekly_DTX+Trastuzumab (2回目以降)	21	トラスツズマブBS点滴静注用	6 mg/kg	1	
			ドセタキセル点滴静注	75 mg/m ²	1	
乳癌	CEF	28	フルオロウラシル注	750 mg/Body	1,8	シクロホスファミド 100mg/day 内服 d1-14
			エビルピシン塩酸塩注射用	60 mg/Body	1,8	
乳癌	triweekly_DTX	21	ドセタキセル点滴静注	75 mg/m ²	1	
乳癌	VNR	21	ロゼウス静注液	25 mg/m ²	1,8	
乳癌	Paclitaxel+Trastuzumab (初回)	21	トラスツズマブBS点滴静注用	2 mg/kg	8,15	
			パクリタキセル注	80 mg/m ²	1,8,15	
乳癌	Paclitaxel+Trastuzumab (2回目以降)	21	トラスツズマブBS点滴静注用	2 mg/kg	1,8,15	
			パクリタキセル注	80 mg/m ²	1,8,15	
乳癌	nab-PTX_triweekly	21	アブラキサン点滴静注	260 mg/m ²	1	

がん種	レジメン名	1サイクル (日)	抗がん薬	投与量	投与日 (day)	備考
乳癌	TCH(DOC+CBDCA+HER) (初回)	21	トラスツズマブBS点滴静注用	8 mg/kg	1	
			ドセタキセル点滴静注	75 mg/m ²	1	
			カルボプラチン点滴静注	AUC 6	1	
乳癌	TCH (DOC+CBDCA+HER) (2回目以降)	21	トラスツズマブBS点滴静注用	6 mg/kg	1	
			ドセタキセル点滴静注	75 mg/m ²	1	
			カルボプラチン点滴静注	AUC 6	1	
乳癌	Trastuzumab + PER + DTX (初回)	21	パージェタ点滴静注	840 mg/Body	1	
			トラスツズマブBS点滴静注用	8 mg/kg	1	
			ドセタキセル点滴静注	75 mg/m ²	1	
乳癌	Trastuzumab + PER + DTX (2回目以降)	21	パージェタ点滴静注	420 mg/Body	1	
			トラスツズマブBS点滴静注用	6 mg/kg	1	
			ドセタキセル点滴静注	75 mg/m ²	1	
乳癌	Trastuzumab + PER + PTX (初回)	21	パージェタ点滴静注	840 mg/Body	1	
			トラスツズマブBS点滴静注用	8 mg/kg	1	
			パクリタキセル注	80 mg/m ²	1,8,15	
乳癌	Trastuzumab + PER + PTX (2回目以降)	21	パージェタ点滴静注	420 mg/Body	1	
			トラスツズマブBS点滴静注用	6 mg/kg	1	
			パクリタキセル注	80 mg/m ²	1,8,15	
乳癌	T-DM1	21	カドサイラ点滴静注用	3.6 mg/kg	1	
乳癌	Eribulin	21	ハラヴェン静注	1.4 mg/m ²	1,8	
乳癌	ddEC	14	エビルピシン塩酸塩注射用	90 mg/m ²	1	
			エンドキサン注	600 mg/m ²	1	
乳癌	PAC+Bevacizumab	28	パクリタキセル注	90 mg/m ²	1,8,15	
			ベバシズマブBS点滴静注	10 mg/kg	1,15	
乳癌	TC+H (DOC+CPA+HER) (初回)	21	ドセタキセル点滴静注	75 mg/m ²	1	
			エンドキサン注	600 mg/m ²	1	
			トラスツズマブBS点滴静注用	8 mg/kg	1	
乳癌	TC+H (DOC+CPA+HER) (2回目以降)	21	ドセタキセル点滴静注	75 mg/m ²	1	
			エンドキサン注	600 mg/m ²	1	
			トラスツズマブBS点滴静注用	6 mg/kg	1	
乳癌	Trastuzumab + nab-PTX (1cycle目)	21	トラスツズマブBS点滴静注用	8 mg/kg	1	
			アブラキサン点滴静注	260 mg/m ²	1	
乳癌	Trastuzumab + nab-PTX (2cycle目以降)	21	トラスツズマブBS点滴静注用	6 mg/kg	1	
			アブラキサン点滴静注	260 mg/m ²	1	
乳癌	Trastuzumab + PER + Eribulin (1cycle目)	21	トラスツズマブBS点滴静注用	8 mg/kg	1	
			パージェタ点滴静注	840 mg/Body	1	
			ハラヴェン静注	1.4 mg/m ²	1,8	
乳癌	Trastuzumab + PER + Eribulin (2cycle目以降)	21	トラスツズマブBS点滴静注用	6 mg/kg	1	
			パージェタ点滴静注	420 mg/Body	1	
			ハラヴェン静注	1.4 mg/m ²	1,8	
乳癌	EC (90)	21	エビルピシン塩酸塩注射用	90 mg/m ²	1	
			エンドキサン注	600 mg/m ²	1	
乳癌	Atezolizumab + nab-PTX	28	アブラキサン点滴静注	100 mg/m ²	8	
乳癌	Atezolizumab + nab-PTX	28	テセントリク点滴静注	840 mg/Body	1,15	
			アブラキサン点滴静注	100 mg/m ²	1,8,15	
乳癌	weekly_Paclitaxel	7	パクリタキセル注	80 mg/m ²	1	
乳癌	Trastuzumab Deruxtecan	21	エンハーツ点滴静注用	5.4 mg/kg	1	
乳癌	EC (75)	21	エビルピシン塩酸塩注射用	75 mg/m ²	1	
			エンドキサン注	500 mg/m ²	1	

がん種	レジメン名	1サイクル (日)	抗がん薬	投与量	投与日 (day)	備考
乳癌	Pembrolizumab + PTX (初回、2割開始時)	28	キイトルーダ点滴静注	200 mg/Body	1	
			パクリタキセル注	90 mg/m ²	1,8,15	
乳癌	Pembrolizumab + PTX (Pembrolizumab開始時)	21	キイトルーダ点滴静注	200 mg/Body	1	
乳癌	Pembrolizumab + PTX (PTX開始時)	28	パクリタキセル注	90 mg/m ²	1,8,15	
乳癌	Pembrolizumab + nab-PTX (初回、2割開始時)	28	キイトルーダ点滴静注	200 mg/Body	1	
			アブラキサン点滴静注	100 mg/m ²	1,8,15	
乳癌	Pembrolizumab + nab-PTX (Pembrolizumab開始時)	21	キイトルーダ点滴静注	200 mg/Body	1	
乳癌	Pembrolizumab + nab-PTX (nab-PTX開始時)	28	アブラキサン点滴静注	100 mg/m ²	1,8,15	
乳癌	Pembrolizumab + GEM + CBDCA	21	キイトルーダ点滴静注	200 mg/Body	1	
			ゲムシタピン点滴静注	1000 mg/m ²	1,8	
			カルボプラチン点滴静注	AUC 2	1,8	
乳癌	Pembrolizumab + EC (90)	21	キイトルーダ点滴静注	200 mg/Body	1	
			エビルピシン塩酸塩注射用	90 mg/m ²	1	
			エンドキサン注	600 mg/m ²	1	
乳癌	Pembrolizumab + wPTX+wCBDCA	21	キイトルーダ点滴静注	200 mg/Body	1	
			パクリタキセル注	80 mg/m ²	1,8,15	
			カルボプラチン点滴静注	AUC 1.5	1,8,15	
乳癌	Pembrolizumab + wPTX+3wCBDCA	21	キイトルーダ点滴静注	200 mg/Body	1	
			パクリタキセル注	80 mg/m ²	1,8,15	
			カルボプラチン点滴静注	AUC 5	1	
乳癌	Pembrolizumab (3週毎)	21	キイトルーダ点滴静注	200 mg/Body	1	
乳癌	Pembrolizumab (倍量、6週毎)	42	キイトルーダ点滴静注	400 mg/Body	1	
乳癌	Trastuzumab + PER (1cycle目)	21	パージェタ点滴静注	840 mg/Body	1	
			トラスツマブBS点滴静注用	8 mg/kg	1	
乳癌	Trastuzumab + PER (2cycle目以降)	21	パージェタ点滴静注	420 mg/Body	1	
			トラスツマブBS点滴静注用	6 mg/kg	1	
固形癌	Pembrolizumab (3週毎)	21	キイトルーダ点滴静注	200 mg/Body	1	
固形癌	Pembrolizumab (倍量、6週毎)	42	キイトルーダ点滴静注	400 mg/Body	1	
悪性軟部腫瘍	Eribulin	21	ハラヴェン静注	1.4 mg/m ²	1,8	
脳腫瘍	ACNU + VCR + INF	42	オンコピン注	0.02 mg/kg	1,2	
			ニドラン注	2 mg/kg	2,3	
脳腫瘍	CBDCA + VP-16	3	エトボシド点滴静注	150 mg/m ²	1,2,3	
			カルボプラチン点滴静注	450 mg/m ²	1	
脳腫瘍	ICE	28	エトボシド点滴静注	60 mg/m ²	1,2,3,4,5	
			イホマイド注	900 mg/m ²	1,2,3,4,5	
			シスプラチン点滴静注	20 mg/m ²	1,2,3,4,5	
脳腫瘍	PCV	42	ニドラン注	70 mg/m ²	1	経口：塩酸プロカルバジン 60mg/m ² day8-21
			オンコピン注	1.4 mg/m ²	8,29	
脳腫瘍	Bevacizumab+TMZ+RT	70	アバスチン点滴静注	10 mg/kg	1,15,29,42	テモゾロミド 75mg/m ² /回、1日1回連日42日間 + 放射線照射併用 (テモゾロミド最大49日間継続投与可能)
脳腫瘍	Bevacizumab+TMZ (Bevacizumab_biweekly)	28	アバスチン点滴静注	10 mg/kg	1,15	テモゾロミド 150mg/m ² 内服 day1-5(忍容性が確認される場合は200mg/m ² に増量可)
脳腫瘍	Bevacizumab単剤 (triweekly)	21	アバスチン点滴静注	15 mg/kg	1	
尿路上皮癌	GC	28	ゲムシタピン点滴静注	1000 mg/m ²	1,8,15	
			シスプラチン点滴静注	70 mg/m ²	2	
尿路上皮癌	M-VAC	28	メソトレキセート注	30 mg/m ²	1,15,22	
			エクザール注	3 mg/m ²	2,15,22	
			シスプラチン点滴静注	70 mg/m ²	2	
			ドキシソルピシン塩酸塩注	30 mg/m ²	2	

がん種	レジメン名	1サイクル (日)	抗がん薬	投与量	投与日 (day)	備考
尿路上皮癌	M-VAN	28	ドキシソルピシン塩酸塩注	30 mg/m ²	2	
			メントレキセート注	30 mg/m ²	1,15,22	
			エウザール注	3 mg/m ²	2,15,22	
			アクブラ静注用	100 mg/m ²	2	
尿路上皮癌	TN	21	パクリタキセル注	200 mg/m ²	1	
			アクブラ静注用	100 mg/m ²	2	
尿路上皮癌	EC-TAI	21	エビルピシン塩酸塩注射用	30 mg/Body	1	
			シスプラチン点滴静注	100 mg/Body	1	
尿路上皮癌	EN-TAI	28	エビルピシン塩酸塩注射用	30 mg/Body	1	
			アクブラ静注用	100 mg/Body	1	
尿路上皮癌	GN	28	ゲムシタピン点滴静注	1000 mg/m ²	1,8,15	
			アクブラ静注用	100 mg/m ²	2	
尿路上皮癌	Pembrolizumab (3週毎)	21	キイトルーダ点滴静注	200 mg/Body	1	
尿路上皮癌	Pembrolizumab (倍量、6週毎)	42	キイトルーダ点滴静注	400 mg/Body	1	
尿路上皮癌	Avelumab	14	バベンチオ点滴静注	10 mg/kg	1	
尿路上皮癌	Enfortumab Vedotin	28	バドセブ点滴静注用	1.25 mg/kg	1,8,15	
尿路上皮癌	Nivolumab (2週毎)	14	オブジーボ点滴静注	240 mg/Body	1	
尿路上皮癌	Nivolumab (倍量、4週毎)	28	オブジーボ点滴静注	480 mg/Body	1	
精巣腫瘍	BEP	21	プレオ注	30 mg/Body	1,8,15	
			シスプラチン点滴静注	20 mg/m ²	1,2,3,4,5	
			エトポシド点滴静注	100 mg/m ²	1,2,3,4,5	
前立腺癌	Docetaxel	21	ドセタキセル点滴静注	75 mg/m ²	1	
前立腺癌	Cabazitaxel	21	ジェブタナ点滴静注	25 mg/m ²	1	ブレドニゾロン10mg 連日内服
前立腺癌	Darolutamide+ADT+DTX	21	ドセタキセル点滴静注	75 mg/m ²	1	ダロルタミド 1200mg/day(600mg 1日2回) 併用
腎細胞癌	IL-2	7	イムネース注	105 IU/Body	1,4	
腎細胞癌	Temsirolimus	7	トーリセル点滴静注	25 mg/Body	1	
腎細胞癌	Nivolumab (2週毎)	14	オブジーボ点滴静注	240 mg/Body	1	
腎細胞癌	Pembrolizumab + Axitinib (3週毎)	21	キイトルーダ点滴静注	200 mg/Body	1	アキシチニブ連日投与
腎細胞癌	Pembrolizumab + Axitinib (倍量、6週毎)	42	キイトルーダ点滴静注	400 mg/Body	1	アキシチニブ連日投与
腎細胞癌	Nivolumab (倍量、4週毎)	28	オブジーボ点滴静注	480 mg/Body	1	
腎細胞癌	Avelumab + Axitinib	14	バベンチオ点滴静注	10 mg/kg	1	アキシチニブ連日投与
			ニボルマブ点滴静注	240 mg/Body	1	
腎細胞癌	Nivolumab+Ipilimumab	21	オブジーボ点滴静注	240 mg/Body	1	
			ヤーボイ点滴静注	1 mg/kg	1	
腎細胞癌	Nivolumab + Cabozantinib (2週毎)	14	オブジーボ点滴静注	240 mg/Body	1	カボザンチニブ 連日投与
腎細胞癌	Nivolumab + Cabozantinib (4週毎)	28	オブジーボ点滴静注	480 mg/Body	1	カボザンチニブ 連日投与
腎細胞癌	Pembrolizumab + Lenvatinib (3週毎)	21	キイトルーダ点滴静注	200 mg/Body	1	レンバチニブ連日投与
腎細胞癌	Pembrolizumab + Lenvatinib (倍量、6週毎)	42	キイトルーダ点滴静注	400 mg/Body	1	レンバチニブ連日投与
腎細胞癌	Pembrolizumab (3週毎)	21	キイトルーダ点滴静注	200 mg/Body	1	
腎細胞癌	Pembrolizumab (倍量、6週毎)	42	キイトルーダ点滴静注	400 mg/Body	1	
子宮体癌	AP	21	ドキシソルピシン塩酸塩注	60 mg/m ²	1	
			シスプラチン点滴静注	50 mg/m ²	1	
子宮体癌	DP	21	ドセタキセル点滴静注	70 mg/m ²	1	
			シスプラチン点滴静注	60 mg/m ²	1	
子宮体癌	CBDCA_q1w	28	カルボプラチン点滴静注	AUC 2	1,8,15	
子宮体癌	CBDCA_q3w	21	カルボプラチン点滴静注	AUC 5	1	
子宮体癌	Conventional TC	21	パクリタキセル注	175 mg/m ²	1	
			カルボプラチン点滴静注	AUC 5	1	
子宮体癌	wTC(Cq4w)	28	パクリタキセル注	80 mg/m ²	1,8,15	
			カルボプラチン点滴静注	AUC 5	1	

がん種	レジメン名	1サイクル (日)	抗がん薬	投与量	投与日 (day)	備考
子宮体癌	wTC	28	パクリタキセル注	80 mg/m ²	1,8,15	
			カルボプラチン点滴静注	AUC 2	1,8,15	
子宮体癌	Pembrolizumab + Lenvatinib (3週毎)	21	キイトルーダ点滴静注	200 mg/Body	1	レンパチニブ : 20mg/day 連日
子宮体癌	Pembrolizumab + Lenvatinib (6週毎)	42	キイトルーダ点滴静注	400 mg/Body	1	レンパチニブ : 20mg/day 連日
子宮肉腫	DTX+GEM	21	ゲムシタピン点滴静注	800 mg/m ²	1,8	
			ドセタキセル点滴静注	60 mg/m ²	8	
子宮頸癌	CDDP+RT	7	シスプラチン点滴静注	40 mg/m ²	1	
子宮頸癌	CDGP+RT	7	アクブラ静注用	30 mg/m ²	1	
子宮頸癌	CPT-11 + CDGP	21	カンプト点滴静注	60 mg/m ²	1,8	
			アクブラ静注用	80 mg/m ²	1	
子宮頸癌	wTC	28	パクリタキセル注	80 mg/m ²	1,8,15	
			カルボプラチン点滴静注	AUC 2	1,8,15	
子宮頸癌	Conventional TC	21	パクリタキセル注	175 mg/m ²	1	
			カルボプラチン点滴静注	AUC 5	1	
子宮頸癌	CDDP	21	シスプラチン点滴静注	50 mg/m ²	1	
子宮頸癌	Conventional TC+Bevacizumab	21	パクリタキセル注	175 mg/m ²	1	
			カルボプラチン点滴静注	AUC 5	1	
			アバスタチン点滴静注	15 mg/kg	1	
子宮頸癌	CPT-11 + CDGP	28	カンプト点滴静注	50 mg/m ²	1	
			アクブラ静注用	80 mg/m ²	1	
子宮頸癌	PTX + CDDP + Bevacizumab	21	パクリタキセル注	175 mg/m ²	1	
			シスプラチン点滴静注	50 mg/m ²	1	
			アバスタチン点滴静注	15 mg/kg	1	
子宮頸癌	Bevacizumab維持療法	21	アバスタチン点滴静注	15 mg/kg	1	
子宮頸癌	Pembrolizumab+Conventional TC+Bevacizumab	21	キイトルーダ点滴静注	200 mg/Body	1	
			パクリタキセル注	175 mg/m ²	1	
			カルボプラチン点滴静注	AUC 5	1	
			アバスタチン点滴静注	15 mg/kg	1	
子宮頸癌	Cemiplimab	21	リプタヨ点滴静注	350 mg/Body	1	
卵巣癌	Conventional TC	21	パクリタキセル注	175 mg/m ²	1	
			カルボプラチン点滴静注	AUC 5	1	
卵巣癌	wTC	28	パクリタキセル注	80 mg/m ²	1,8,15	
			カルボプラチン点滴静注	AUC 2	1,8,15	
卵巣癌	wTC(Cq4w)	28	パクリタキセル注	80 mg/m ²	1,8,15	
			カルボプラチン点滴静注	AUC 5	1	
卵巣癌	dd-TC	21	パクリタキセル注	80 mg/m ²	1,8,15	
			カルボプラチン点滴静注	AUC 5	1	
卵巣癌	weekly_PTX	28	パクリタキセル注	80 mg/m ²	1,8,15	
卵巣癌	weekly_CPT-11	28	カンプト点滴静注	100 mg/m ²	1,8,15	
卵巣癌	biweekly_CPT-11	14	カンプト点滴静注	150 mg/m ²	1	
卵巣癌	CPT-11+CDDP	28	カンプト点滴静注	60 mg/m ²	1,8,15	
			シスプラチン点滴静注	60 mg/m ²	1	
卵巣癌	GEM	28	ゲムシタピン点滴静注	1000 mg/m ²	1,8,15	
卵巣癌	DTX+GEM	21	ドセタキセル点滴静注	60 mg/m ²	8	
			ゲムシタピン点滴静注	800 mg/m ²	1,8	
卵巣癌	CDGP	28	アクブラ静注用	80 mg/m ²	1	
卵巣癌	PLD	28	ドキシル注	50 mg/m ²	1	
卵巣癌	CBDCA + PLD	28	ドキシル注	30 mg/m ²	1	
			カルボプラチン点滴静注	AUC 5	1	

がん種	レジメン名	1サイクル (日)	抗がん薬	投与量	投与日 (day)	備考
卵巣癌	Topotecan	21	ハイカムチン注	1.5 mg/m ²	1,2,3,4,5	
卵巣癌	BEP	21	ブレオ注	30 mg/Body	2,9,16	
			シスプラチン点滴静注	20 mg/m ²	1,2,3,4,5	
			エトポシド点滴静注	100 mg/m ²	1,2,3,4,5	
卵巣癌	CBDCA+GEM	21	ゲムシタピン点滴静注	1000 mg/m ²	1,8	
			カルボプラチン点滴静注	AUC 5	1	
卵巣癌	Conventional TC+Bevacizumab	21	パクリタキセル注	175 mg/m ²	1	
			カルボプラチン点滴静注	AUC 5	1	
			ベバシズマブBS点滴静注	15 mg/kg	1	
卵巣癌	CPT-11+Bevacizumab	21	カンプト点滴静注	100 mg/m ²	1,8	
			ベバシズマブBS点滴静注	15 mg/kg	1	
卵巣癌	Topotecan + Bevacizumab	21	ベバシズマブBS点滴静注	15 mg/kg	1	
			ハイカムチン注	1.25 mg/m ²	1,2,3,4,5	
卵巣癌	DOC+CBDCA	21	ドセタキセル点滴静注	75 mg/m ²	1	
			カルボプラチン点滴静注	AUC 5	1	
卵巣癌	Bevacizumab維持療法	21	ベバシズマブBS点滴静注	15 mg/kg	1	
卵巣癌	GEM+Bevacizumab	21	ゲムシタピン点滴静注	1000 mg/m ²	1,8	
			ベバシズマブBS点滴静注	15 mg/kg	1	
卵巣癌	PLD + Bevacizumab (2週毎)	28	ベバシズマブBS点滴静注	10 mg/kg	1,15	
			ドキシル注	40 mg/m ²	1	
頭頸部癌	CBDCA+Rad	42	カルボプラチン点滴静注	60 mg/m ²	1,8,15,22,29,36	
頭頸部癌	CDDP+DTX動注	3	ドセタキセル点滴静注	20 mg/Body	1	
			シスプラチン点滴静注	100 mg/m ²	1	
頭頸部癌	DTX+CDDP+5FU	21	フルオロウラシル注	375+375 mg/m ²	2,3,4,5	
			ドセタキセル点滴静注	60 mg/m ²	1	
			シスプラチン点滴静注	37.5+37.5 mg/m ²	6	
頭頸部癌	DTX+CBDCA+5FU	21	フルオロウラシル注	375+375 mg/m ²	2,3,4,5	
			ドセタキセル点滴静注	60 mg/m ²	1	
			カルボプラチン点滴静注	225 mg/m ²	6,7	
頭頸部癌	Cetuximab + CF (初回)	21	アービタックス注射液	400 mg/m ²	2	
			アービタックス注射液	250 mg/m ²	9,16	
			フルオロウラシル注	800 mg/m ²	2,3,4,5,6	
			シスプラチン点滴静注	80 mg/m ²	2	
頭頸部癌	Cetuximab + CF (2回目以降)	21	アービタックス注射液	250 mg/m ²	2,9,16	
			フルオロウラシル注	800 mg/m ²	2,3,4,5,6	
			シスプラチン点滴静注	80 mg/m ²	2	
頭頸部癌	Cetuximab+CBDCA+5FU (初回)	21	アービタックス注射液	400 mg/m ²	2	
			アービタックス注射液	250 mg/m ²	9,16	
			カルボプラチン点滴静注	AUC 5	2	
			フルオロウラシル注	800 mg/m ²	2,3,4,5,6	
頭頸部癌	Cetuximab+CBDCA+5FU (2回目以降)	21	アービタックス注射液	250 mg/m ²	2,9,16	
			カルボプラチン点滴静注	AUC 5	2	
			フルオロウラシル注	800 mg/m ²	2,3,4,5,6	
頭頸部癌	Cetuximab	7	アービタックス注射液	250 mg/m ²	1	
頭頸部癌	Cetuximab (2週毎)	14	アービタックス注射液	500 mg/m ²	1	
頭頸部癌	TPF	21	フルオロウラシル注	750 mg/m ²	2,3,4,5,6	
			ドセタキセル点滴静注	60 mg/m ²	2	
			シスプラチン点滴静注	75 mg/m ²	2	

がん種	レジメン名	1サイクル (日)	抗がん薬	投与量	投与日 (day)	備考
頭頸部癌	CF	21	フルオロウラシル注	800 mg/m ²	2,3,4,5,6	
			シスプラチン点滴静注	80 mg/m ²	2	
頭頸部癌	Cetuximab+RT	49	アービタックス注射液	400 mg/m ²	1	
			アービタックス注射液	250 mg/m ²	8,15,22,29,36,43	
頭頸部癌	Cetuximab (2週毎)+RT	56	アービタックス注射液	500 mg/m ²	1,15,29,43	
頭頸部癌	CDDP+RT	21	シスプラチン点滴静注	80 mg/m ²	2	
頭頸部癌	weekly_PTX	56	パクリタキセル注	100 mg/m ²	1,8,15,22,29,36	
頭頸部癌	DTX+CBDCA	21	ドセタキセル点滴静注	60 mg/m ²	2	
			カルボプラチン点滴静注	AUC 5	2	
頭頸部癌	Cetuximab+PTX (初回)	7	アービタックス注射液	400 mg/m ²	1	
			パクリタキセル注	80 mg/m ²	1	
頭頸部癌	Cetuximab+PTX (2回目以降)	7	アービタックス注射液	250 mg/m ²	1	
			パクリタキセル注	80 mg/m ²	1	
頭頸部癌	Cetuximab (2週毎)+PTX	14	アービタックス注射液	500 mg/m ²	1	
			パクリタキセル注	80 mg/m ²	1	
頭頸部癌	PCE (1コース目)	21	アービタックス注射液	400 mg/m ²	1	
			アービタックス注射液	250 mg/m ²	8,15	
			パクリタキセル注	100 mg/m ²	1,8	
			カルボプラチン点滴静注	AUC 2	1,8	
頭頸部癌	PCE (2コース目以降)	21	アービタックス注射液	250 mg/m ²	1,8,15	
			パクリタキセル注	100 mg/m ²	1,8	
			カルボプラチン点滴静注	AUC 2	1,8	
頭頸部癌	Nivolumab (2週毎)	14	オブジーボ点滴静注	240 mg/Body	1	
頭頸部癌	Nivolumab (倍量、4週毎)	28	オブジーボ点滴静注	480 mg/Body	1	
頭頸部癌	FP+Pembrolizumab	21	フルオロウラシル注	800 mg/m ²	2,3,4,5	
			キイトルーダ点滴静注	200 mg/Body	2	
			シスプラチン点滴静注	80 mg/m ²	2	
頭頸部癌	Pembrolizumab	21	キイトルーダ点滴静注	200 mg/Body	1	
胃癌	CDDP+S-1	35	シスプラチン点滴静注	60 mg/m ²	8	S-1 80mg/m ² 内服 経口 d1-d21 3投2休
胃癌	CPT-11+CDDP	14	カンプト点滴静注	60 mg/m ²	1	
			シスプラチン点滴静注	30 mg/m ²	1	
胃癌	weekly_PTX	28	パクリタキセル注	80 mg/m ²	1,8,15	
胃癌	triweekly_DTX	21	ドセタキセル点滴静注	60 mg/m ²	1	
胃癌	DTX+S-1_q3w	21	ドセタキセル点滴静注	40 mg/m ²	1	S-1 80mg/m ² 内服 day1-14 2投1休
胃癌	MTX+5-FU時間差療法	7	メソトレキサート点滴静注	100 mg/m ²	1	ロイコボリン10mg/m ² /回：MTX投与終了後24/30/36/42/48/54時間目に投与（ロイコボリンは注射もしくは内服にて投与）
			フルオロウラシル注	600 mg/m ²	1	
胃癌	XP	21	シスプラチン点滴静注	80 mg/m ²	1	カベシタピン 2000mg/m ² /day 経口 朝夕食後30分以内 day1-14, CCr30-50 : 75%用量 (1段階減量) 30未満：禁忌
胃癌	XP+Trastuzumab	21	トラスツズマブ点滴静注用	8 mg/kg	1	トラスツズマブ：初回は8mg/kg、2回目以降は6mg/kg
			トラスツズマブ点滴静注用	6 mg/kg	1	カベシタピン 2000mg/m ² /day 経口 朝夕食後30分以内 day1-14, CCr30-50 : 75%用量 (1段階減量) 30未満：禁忌
			シスプラチン点滴静注	80 mg/m ²	1	
胃癌	SOX (130)	21	エルプラット点滴静注	130 mg/m ²	1	S-1 80~120mg/day 1日2回 day1-14 経口、腎機能に応じた減量基準あり
胃癌	Ramucirumab+PTX	28	パクリタキセル注	80 mg/m ²	1,8,15	
			サイラムザ点滴静注液	8 mg/kg	1,15	
胃癌	SOX (100)	21	エルプラット点滴静注	100 mg/m ²	1	S-1 80~120mg/day 1日2回 day1-14 経口、腎機能に応じた減量基準あり
胃癌	CapeOX	21	エルプラット点滴静注	130 mg/m ²	1	カベシタピン 1000mg/m ² /回 1日2回day1(夕)~day15(朝) 2投1休、CCr30-50 : 75%用量 (1段階減量) 30未満：禁忌
胃癌	CPT-11	14	カンプト点滴静注	150 mg/m ²	1	

がん種	レジメン名	1サイクル (日)	抗がん薬	投与量	投与日 (day)	備考
胃癌	weekly_nab-PTX	28	アブラキサン点滴静注	100 mg/m ²	1,8,15	
胃癌	Nivolumab (2週毎)	14	オプジーボ点滴静注	240 mg/Body	1	
胃癌	Ramucirumab + nab-PTX	28	サイラムザ点滴静注液	8 mg/kg	1,15	
			アブラキサン点滴静注	100 mg/m ²	1,8,15	
胃癌	SOX (100) + Trastuzumab (初回)	21	トラスツズマブBS点滴静注用	8 mg/kg	1	S-1 80~120mg/day 1日2回 day1-14 経口、腎機能に応じた減量基準あり
			エルブラット点滴静注	100 mg/m ²	1	
胃癌	SOX (100) + Trastuzumab (2回目以降)	21	トラスツズマブBS点滴静注用	6 mg/kg	1	S-1 80~120mg/day 1日2回 day1-14 経口、腎機能に応じた減量基準あり
			エルブラット点滴静注	100 mg/m ²	1	
胃癌	SOX (130) + Trastuzumab (初回)	21	トラスツズマブBS点滴静注用	8 mg/kg	1	S-1 80~120mg/day 1日2回 day1-14 経口、腎機能に応じた減量基準あり
			エルブラット点滴静注	130 mg/m ²	1	
胃癌	SOX(130) + Trastuzumab (2回目以降)	21	トラスツズマブBS点滴静注用	6 mg/kg	1	S-1 80~120mg/day 1日2回 day1-14 経口、腎機能に応じた減量基準あり
			エルブラット点滴静注	130 mg/m ²	1	
胃癌	FOLFOX	14	レボホリナート点滴静注	200 mg/m ²	1	
			エルブラット点滴静注	85 mg/m ²	1	
			フルオロウラシル注	400 mg/m ²	1	
			フルオロウラシル注	2400 mg/m ²	1	
胃癌	Trastuzumab Deruxtecan	21	エンハーツ点滴静注用	6.4 mg/kg	1	
胃癌	Nivolumab (倍量、4週毎)	28	オプジーボ点滴静注	480 mg/Body	1	
胃癌	Nivolumab+FOLFOX	14	オプジーボ点滴静注	240 mg/Body	1	
			レボホリナート点滴静注	200 mg/m ²	1	
			エルブラット点滴静注	85 mg/m ²	1	
			フルオロウラシル注	400 mg/m ²	1	
			フルオロウラシル注	2400 mg/m ²	1	
胃癌	Nivolumab+SOX (100)	21	オプジーボ点滴静注	360 mg/Body	1	S-1 80~120mg/day 1日2回 day1-14 経口、腎機能に応じた減量基準あり
			エルブラット点滴静注	100 mg/m ²	1	
胃癌	Nivolumab+SOX (130)	21	オプジーボ点滴静注	360 mg/Body	1	S-1 80~120mg/day 1日2回 day1-14 経口、腎機能に応じた減量基準あり
			エルブラット点滴静注	130 mg/m ²	1	
胃癌	Nivolumab+CapeOX	21	オプジーボ点滴静注	360 mg/Body	1	カペシタピン 1000mg/m ² /回 1日2回day1(夕)~day15(朝) 2投1休、CCr30-50 : 75%用量 (1段階減量) 30未満 : 禁忌
			エルブラット点滴静注	130 mg/m ²	1	
胃癌	FOLFOX + Trastuzumab (1サイクル目)	21	トラスツズマブBS点滴静注用	8 mg/kg	1	
			レボホリナート点滴静注	200 mg/m ²	1	
			エルブラット点滴静注	85 mg/m ²	1	
			フルオロウラシル注	400 mg/m ²	1	
			フルオロウラシル注	2400 mg/m ²	1	
胃癌	FOLFOX + Trastuzumab (2サイクル目以降、FOLFOX)	14	レボホリナート点滴静注	200 mg/m ²	1	
			エルブラット点滴静注	85 mg/m ²	1	
			フルオロウラシル注	400 mg/m ²	1	
			フルオロウラシル注	2400 mg/m ²	1	
胃癌	FOLFOX + Trastuzumab (2サイクル目以降、Trastuzumab)	21	トラスツズマブBS点滴静注用	6 mg/kg	1	
胃癌	FOLFOX + Trastuzumab (2サイクル目以降)	21	トラスツズマブBS点滴静注用	6 mg/kg	1	
			レボホリナート点滴静注	200 mg/m ²	1	
			エルブラット点滴静注	85 mg/m ²	1	
			フルオロウラシル注	400 mg/m ²	1	
			フルオロウラシル注	2400 mg/m ²	1	
食道癌	CRT(標準的FP)	28	フルオロウラシル注	700 mg/m ²	2,3,4,5	
			シスプラチン点滴静注	70 mg/m ²	2	
食道癌	CRT後療法(FP)	28	フルオロウラシル注	800 mg/m ²	2,3,4,5,6	
			シスプラチン点滴静注	80 mg/m ²	2	

がん種	レジメン名	1サイクル (日)	抗がん薬	投与量	投与日 (day)	備考
食道癌	CRT(low dose FP)	7	シスプラチン点滴静注	4 mg/m ²	1,2,3,4,5	
			フルオロウラシル注	200 mg/m ²	1,2,3,4,5	
食道癌	triweekly_DTX	21	ドセタキセル点滴静注	70 mg/m ²	1	
食道癌	weekly_PTX	49	パクリタキセル注	100 mg/m ²	1,8,15,22,29,36	
食道癌	FP	21	フルオロウラシル注	800 mg/m ²	2,3,4,5,6	
			シスプラチン点滴静注	80 mg/m ²	2	
食道癌	Nivolumab (2週毎)	14	オプジーボ点滴静注	240 mg/Body	1	
食道癌	Nivolumab (倍量、4週毎)	28	オプジーボ点滴静注	480 mg/Body	1	
食道癌	Pembrolizumab + FP	21	フルオロウラシル注	800 mg/m ²	2,3,4,5,6	
			キイトルーダ点滴静注	200 mg/Body	2	
			シスプラチン点滴静注	80 mg/m ²	2	
食道癌	Nivolumab (2週毎) + Ipilimumab	42	オプジーボ点滴静注	240 mg/Body	1,15,29	
			ヤーボイ点滴静注	1 mg/kg	1	
食道癌	Nivolumab (3週毎) + Ipilimumab	42	オプジーボ点滴静注	360 mg/Body	1,22	
			ヤーボイ点滴静注	1 mg/kg	1	
食道癌	Nivolumab (2週毎) + FP	28	フルオロウラシル注	800 mg/m ²	2,3,4,5,6	
			オプジーボ点滴静注	240 mg/Body	2,16	
			シスプラチン点滴静注	80 mg/m ²	2	
食道癌	Nivolumab (4週毎) + FP	28	フルオロウラシル注	800 mg/m ²	2,3,4,5,6	
			オプジーボ点滴静注	480 mg/Body	2	
			シスプラチン点滴静注	80 mg/m ²	2	
膵胆道癌	GEM	28	ゲムシタピン点滴静注	1000 mg/m ²	1,8,15	
膵胆道癌	GEM+radiation	28	ゲムシタピン点滴静注	1000 mg/m ²	1,8,15	
膵胆道癌	Erlotinib + GEM	28	ゲムシタピン点滴静注	1000 mg/m ²	1,8,15	エルロチニブ錠 100mg/日 経口 連日d1-28
膵胆道癌	GEM + CDDP	21	ゲムシタピン点滴静注	1000 mg/m ²	1,8	
			シスプラチン点滴静注	25 mg/m ²	1,8	
膵胆道癌	FOLFIRINOX	14	エルブラット点滴静注	85 mg/m ²	1	
			レボホリナート点滴静注	200 mg/m ²	1	
			カンプト点滴静注	180 mg/m ²	1	
			フルオロウラシル注	400 mg/m ²	1	
			フルオロウラシル注	2400 mg/m ²	1	
膵胆道癌	nab-PTX+GEM	28	アブラキサン点滴静注	125 mg/m ²	1,8,15	
			ゲムシタピン点滴静注	1000 mg/m ²	1,8,15	
膵胆道癌	GS	21	ゲムシタピン点滴静注	1000 mg/m ²	1,8	S-1 経口投与 day1-14 100mg/body (1.5<BSA)、80mg/body (1.25<BSA≤1.5)、60mg/body (BSA≤1.25)
膵胆道癌	nal-IRI+5-FU/LV	14	オニバド点滴静注	70 mg/m ²	1	
			レボホリナート点滴静注	200 mg/m ²	1	
			フルオロウラシル注	2400 mg/m ²	1	
膵胆道癌	mFOLFIRINOX	14	エルブラット点滴静注	85 mg/m ²	1	
			カンプト点滴静注	150 mg/m ²	1	
			レボホリナート点滴静注	200 mg/m ²	1	
			フルオロウラシル注	2400 mg/m ²	1	
膵胆道癌	GCS	14	ゲムシタピン点滴静注	1000 mg/m ²	1	S-1 80-120mg/day day1-7
			シスプラチン点滴静注	25 mg/m ²	1	
膵胆道癌	Durvalumab + GC	21	イミフィンジ点滴静注	1500 mg/Body	1	
			ゲムシタピン点滴静注	1000 mg/m ²	1,8	
			シスプラチン点滴静注	25 mg/m ²	1,8	
膵胆道癌	Durvalumab維持療法	28	イミフィンジ点滴静注	1500 mg/Body	1	

がん種	レジメン名	1サイクル (日)	抗がん薬	投与量	投与日 (day)	備考
肝臓	low dose FP	7	シスプラチン点滴静注	20 mg/Body	1	
			フルオロウラシル注	250 mg/Body	1	
肝臓	動注用CDDP	28	動注用アイエーコール	65 mg/m ²	1	
肝臓	Atezolizumab + Bevacizumab	21	テセントリク点滴静注	1200 mg/Body	1	
			アバスチン点滴静注	15 mg/kg	1	
肝臓	Durvalumab+ Tremelimumab (初回)	28	イジド点滴静注	300 mg/Body	1	
			イミフィンジ点滴静注	1500 mg/Body	1	
肝臓	Durvalumab+ Tremelimumab (2回目以降)	28	イミフィンジ点滴静注	1500 mg/Body	1	
肺癌	PEM	21	ペメトレキセド点滴静注液	500 mg/m ²	1	
肺癌	Amrubicin	21	カルセド注射用	45 mg/m ²	1,2,3	
肺癌	Bevacizumab維持療法	21	ベバシズマブBS点滴静注	15 mg/kg	1	
肺癌	CBDCA+Paclitaxel+Bevacizumab	21	パクリタキセル注	200 mg/m ²	1	
			カルボプラチン点滴静注	AUC 4~6	1	
			ベバシズマブBS点滴静注	15 mg/kg	1	
肺癌	CBDCA+Paclitaxel	21	パクリタキセル注	200 mg/m ²	1	
			カルボプラチン点滴静注	AUC 4~6	1	
肺癌	CBDCA+PEM	21	ペメトレキセド点滴静注液	500 mg/m ²	1	
			カルボプラチン点滴静注	AUC 5~6	1	
肺癌	CBDCA+CPT-11	28	カンプト点滴静注	60 mg/m ²	1,8,15	
			カルボプラチン点滴静注	AUC 4~6	1	
肺癌	CBDCA+GEM	21	ゲムシタビン点滴静注	1000 mg/m ²	1,8	
			カルボプラチン点滴静注	AUC 4~6	1	
肺癌	CBDCA+S-1	21	カルボプラチン点滴静注	AUC 4~5	1	S-1 1日2回 朝夕後、2週間内服、1週間休薬、体表面積1.25m ² 未満 40mg/回、1.25m ² 以上1.5m ² 未満 50mg/回、1.5m ² 以上 60mg/回
肺癌	CBDCA+VP-16	21	エトポシド点滴静注	100 mg/m ²	1,2,3	
			カルボプラチン点滴静注	AUC 4~6	1	
肺癌	CDDP+PEM	21	ペメトレキセド点滴静注液	500 mg/m ²	1	
			シスプラチン点滴静注	75 mg/m ²	1	
肺癌	CDDP+CPT-11	28	カンプト点滴静注	60 mg/m ²	1,8,15	
			シスプラチン点滴静注	60 mg/m ²	1	
肺癌	CDDP+Docetaxel	21	ドセタキセル点滴静注	40 mg/m ²	1,8	
			シスプラチン点滴静注	40 mg/m ²	1,8	
肺癌	CDDP+GEM	21	ゲムシタビン点滴静注	1000 mg/m ²	1,8	
			シスプラチン点滴静注	40 mg/m ²	1,8	
肺癌	CDDP+VP-16	21	エトポシド点滴静注	100 mg/m ²	1,2,3	
			シスプラチン点滴静注	80 mg/m ²	1	
肺癌	Docetaxel	21	ドセタキセル点滴静注	60 mg/m ²	1	
肺癌	GEM	21	ゲムシタビン点滴静注	1000 mg/m ²	1,8	
肺癌	Paclitaxel	28	パクリタキセル注	90 mg/m ²	1,8,15	
肺癌	Topotecan	21	ハイカムチン注	1.2 mg/m ²	1,2,3,4,5	
肺癌	VNR	28	ロゼウス静注液	25 mg/m ²	1,8,15	
肺癌	CDDP+PEM+Bevacizumab	21	ペメトレキセド点滴静注液	500 mg/m ²	1	
			シスプラチン点滴静注	75 mg/m ²	1	
			ベバシズマブBS点滴静注	15 mg/kg	1	
肺癌	PEM+BEV	21	ペメトレキセド点滴静注液	500 mg/m ²	1	
			ベバシズマブBS点滴静注	15 mg/kg	1	
肺癌	CBDCA+PEM+Bevacizumab	21	ペメトレキセド点滴静注液	500 mg/m ²	1	
			カルボプラチン点滴静注	AUC 5~6	1	
			ベバシズマブBS点滴静注	15 mg/kg	1	

がん種	レジメン名	1サイクル (日)	抗がん薬	投与量	投与日 (day)	備考
肺癌	CBDCA+nab_PTX	21	アブラキサン点滴静注	100 mg/m ²	1,8,15	
			カルボプラチン点滴静注	AUC 4~6	1	
肺癌	CDDP+UFT	28	シスプラチン点滴静注	80 mg/m ²	8	UFT 400mg/m ² /day, day1~day14 2投2休
肺癌	Docetaxel+Bevacizumab	21	ベバシズマブBS点滴静注	15 mg/kg	1	
			ドセタキセル点滴静注	60 mg/m ²	1	
肺癌	nab-PTX_weekly	21	アブラキサン点滴静注	100 mg/m ²	1,8,15	
肺癌	CBDCA + nab-PTX+Bevacizumab	21	アブラキサン点滴静注	100 mg/m ²	1,8,15	
			カルボプラチン点滴静注	AUC 4~6	1	
			ベバシズマブBS点滴静注	15 mg/kg	1	
肺癌	erlotinib + Bevacizumab	21	ベバシズマブBS点滴静注	15 mg/kg	1	エルロチニブ150mg/body/day 内服
肺癌	Nivolumab (2週毎)	14	オプジーボ点滴静注	240 mg/Body	1	
肺癌	CDGP + DOC	21	ドセタキセル点滴静注	60 mg/m ²	1	
			アクブラ静注用	100 mg/m ²	1	
肺癌	DOC + Ramucirumab	21	サイラムザ点滴静注液	10 mg/kg	1	
			ドセタキセル点滴静注	60 mg/m ²	1	
肺癌	Pembrolizumab (3週毎)	21	キイトルーダ点滴静注	200 mg/Body	1	
肺癌	CDDP + S-1 (3投2休)	35	シスプラチン点滴静注	60 mg/m ²	8	S-1 80mg/m ² /day, day1~day21 3投2休
肺癌	Atezolizumab	21	テセントリク点滴静注	1200 mg/Body	1	
肺癌	CBDCA + PTX + RT (1cycle目)	56	パクリタキセル注	40 mg/m ²	1,8,15,22,29,36	
			カルボプラチン点滴静注	AUC 2	1,8,15,22,29,36	
肺癌	CBDCA + PTX + RT (2cycle目以降)	21	パクリタキセル注	200 mg/m ²	1	
			カルボプラチン点滴静注	AUC 5	1	
肺癌	Durvalmab	28	イミフィンジ点滴静注	1500 mg/Body	1	
肺癌	CDDP+VNR+RT	28	ロゼウス静注液	20 mg/m ²	1,8	
			シスプラチン点滴静注	80 mg/m ²	1	
肺癌	CBDCA + PEM + Pembrolizumab	21	キイトルーダ点滴静注	200 mg/Body	1	
			ペムトレキセド点滴静注液	500 mg/m ²	1	
			カルボプラチン点滴静注	AUC 5	1	
肺癌	CDDP + PEM + Pembrolizumab	21	キイトルーダ点滴静注	200 mg/Body	1	
			ペムトレキセド点滴静注液	500 mg/m ²	1	
			シスプラチン点滴静注	75 mg/m ²	1	
肺癌	PEM + Pembrolizumab	21	キイトルーダ点滴静注	200 mg/Body	1	
			ペムトレキセド点滴静注液	500 mg/m ²	1	
肺癌	CBDCA + nab-PTX + Pembrolizumab	21	キイトルーダ点滴静注	200 mg/Body	1	
			アブラキサン点滴静注	100 mg/m ²	1,8,15	
			カルボプラチン点滴静注	AUC 4~6	1	
肺癌	CBDCA + PTX + Pembrolizumab	21	キイトルーダ点滴静注	200 mg/Body	1	
			パクリタキセル注	200 mg/m ²	1	
			カルボプラチン点滴静注	AUC 4~6	1	
肺癌	CBDCA + PTX + Bevacizumab + Atezolizumab	21	テセントリク点滴静注	1200 mg/Body	1	
			ベバシズマブBS点滴静注	15 mg/kg	1	
			パクリタキセル注	175 mg/m ²	1	
			カルボプラチン点滴静注	AUC 4~6	1	
肺癌	Bevacizumab + Atezolizumab	21	テセントリク点滴静注	1200 mg/Body	1	
			ベバシズマブBS点滴静注	15 mg/kg	1	
肺癌	CBDCA + VP-16 + Atezolizumab	21	イトボシド点滴静注	100 mg/m ²	1,2,3	
			テセントリク点滴静注	1200 mg/Body	1	
			カルボプラチン点滴静注	AUC 5	1	

がん種	レジメン名	1サイクル (日)	抗がん薬	投与量	投与日 (day)	備考
肺癌	CBDCA + PEM + Atezolizumab	21	テセントリク点滴静注	1200 mg/Body	1	
			ペムトレキセド点滴静注液	500 mg/m ²	1	
			カルボプラチン点滴静注	AUC 5	1	
肺癌	PEM + Atezolizumab	21	テセントリク点滴静注	1200 mg/Body	1	
			ペムトレキセド点滴静注液	500 mg/m ²	1	
肺癌	CBDCA+nab-PTX+Atezolizumab	21	テセントリク点滴静注	1200 mg/Body	1	
			アブラキサン点滴静注	100 mg/m ²	1,8,15	
			カルボプラチン点滴静注	AUC 5	1	
肺癌	CBDCA + VP-16 + Durvalmab	21	エトボシド点滴静注	100 mg/m ²	1,2,3	
			イミフィンジ点滴静注	1500 mg/Body	1	
			カルボプラチン点滴静注	AUC 5	1	
肺癌	CDDP + VP-16 + Durvalmab	21	エトボシド点滴静注	100 mg/m ²	1,2,3	
			イミフィンジ点滴静注	1500 mg/Body	1	
			シスプラチン点滴静注	80 mg/m ²	1	
肺癌	Durvalmab維持療法	28	イミフィンジ点滴静注	1500 mg/Body	1	
肺癌	Nivolumab (倍量、4週毎)	28	オプジーボ点滴静注	480 mg/Body	1	
肺癌	Pembrolizumab (倍量、6週毎)	42	キイトルーダ点滴静注	400 mg/Body	1	
肺癌	CDDP+GEM+Necitumumab	21	ボートラーザ点滴静注	800 mg/Body	1,8	
			ゲムシタビン点滴静注	1000 mg/m ²	1,8	
			シスプラチン点滴静注	60 mg/m ²	1	
肺癌	Necitumumab維持療法	21	ボートラーザ点滴静注	800 mg/Body	1,8	
肺癌	Nivo+Ipi+CBDCA+PTX	42	オプジーボ点滴静注	360 mg/Body	1,2,2	
			ヤーボイ点滴静注	1 mg/kg	1	
			パクリタキセル注	200 mg/m ²	1,2,2	
			カルボプラチン点滴静注	AUC 5	1,2,2	
肺癌	Nivo+Ipi+CBDCA+PEM	42	オプジーボ点滴静注	360 mg/Body	1,2,2	
			ヤーボイ点滴静注	1 mg/kg	1	
			ペムトレキセド点滴静注液	500 mg/m ²	1,2,2	
			カルボプラチン点滴静注	AUC 5	1,2,2	
肺癌	Nivolumab+Ipilimumab	42	オプジーボ点滴静注	360 mg/Body	1,2,2	
			ヤーボイ点滴静注	1 mg/kg	1	
肺癌	Ramucirumab+Erlotinib	14	サイラムザ点滴静注液	10 mg/kg	1	エルロチニブ150mg/day 連日
肺癌	CDDP+VNR	21	ロゼウス静注液	25 mg/m ²	1,8	
			シスプラチン点滴静注	80 mg/m ²	1	
肺癌	CBDCA+nab-PTX+Durva+Treme	21	イジド点滴静注	75 mg/Body	1	
			イミフィンジ点滴静注	1500 mg/Body	1	
			アブラキサン点滴静注	100 mg/m ²	1,8,15	
			カルボプラチン点滴静注	AUC 5	1	
肺癌	CBDCA+PEM+Durva+Treme	21	イジド点滴静注	75 mg/Body	1	
			イミフィンジ点滴静注	1500 mg/Body	1	
			ペムトレキセド点滴静注液	500 mg/m ²	1	
			カルボプラチン点滴静注	AUC 5	1	
肺癌	Durva+Treme (維持療法期、12週目・16週目)	56	イミフィンジ点滴静注	1500 mg/Body	1、29	
			イジド点滴静注	75 mg/Body	29	
肺癌	Durvalumab(維持療法期、20週目以降)	28	イミフィンジ点滴静注	1500 mg/Body	1	
肺癌	PEM+Durva+Treme (維持療法期、12週目・16週目)	56	イミフィンジ点滴静注	1500 mg/Body	1,29	
			イジド点滴静注	75 mg/Body	29	
			ペムトレキセド点滴静注液	500 mg/m ²	1,29	

がん種	レジメン名	1サイクル(日)	抗がん薬	投与量	投与日(day)	備考
肺癌	PEM+Durvalumab(維持療法期、20週目以降)	28	イミフィンジ点滴静注	1500 mg/Body	1	
			ベムトレキセド点滴静注液	500 mg/m ²	1	
肺癌	Nivo+CBDCA+PTX	21	オブジーボ点滴静注	360 mg/Body	1	
			パクリタキセル注	200 mg/m ²	1	
			カルボプラチン点滴静注	AUC 5	1	
肺癌	Nivo + CDDP+PEM	21	オブジーボ点滴静注	360 mg/Body	1	
			ベムトレキセド点滴静注液	500 mg/m ²	1	
			シスプラチン点滴静注	75 mg/m ²	1	
悪性胸膜中皮腫	Nivolumab+Ipilimumab	42	オブジーボ点滴静注	360 mg/Body	1,22	
			ヤーボイ点滴静注	1 mg/kg	1	
AML	VEN + AZA	28	ビダーザ注射用	75 mg/m ²	1,2,3,4,5,6,7	ベネトクラス投与量：添付文書参照
CLL	Rit + VEN (1サイクル目)	28	リツキシマブBS点滴静注	375 mg/m ²	1	ベネトクラス併用
CLL	Rit + VEN (2サイクル以降)	28	リツキシマブBS点滴静注	500 mg/m ²	1	ベネトクラス併用
MM	VCD (Twice_weekly)	21	エンドキサン注	500 mg/m ²	1,8	デキサメタゾン40mg/day 経口 day 1、4、8、11
			ボルテゾミブ注射用 3 mg	1.3 mg/m ²	1,4,8,11	
MM	VCD (Once_weekly)	35	エンドキサン注	300 mg/m ²	1,8,15,22	デキサメタゾン40mg/day 経口 day1、8、15、22
			ボルテゾミブ注射用 3 mg	1.3 mg/m ²	1,8,15,22	
MM	KRD (1サイクル目)	28	カイプロリス点滴静注用	20 mg/m ²	1,2	投与前デキサメタゾンday1,8,15,22 : 40mg、day2,9,16 : 4mg内服、レナリドミド : day1-21内服
			カイプロリス点滴静注用	27 mg/m ²	8,9,15,16	
MM	KRD (2~12サイクル目)	28	カイプロリス点滴静注用	27 mg/m ²	1,2,8,9,15,16	投与前デキサメタゾンday1,8,15,22 : 40mg、day2,9,16 : 4mg内服、レナリドミド : day1-21内服
MM	KRD (13サイクル目以降)	28	カイプロリス点滴静注用	27 mg/m ²	1,2,15,16	投与前デキサメタゾンday1,8,15,22 : 40mg、day2,16 : 4mg内服、レナリドミド : day1-21内服
MM	E-Ld (1cycle目)	28	エムプリシティ点滴静注用	10 mg/kg	1,8,15,22	レナリドミド day1-21内服、デキサメタゾン28mg day1,8,15,22内服
MM	E-Ld (2cycle目)	28	エムプリシティ点滴静注用	10 mg/kg	1,8,15,22	レナリドミド day1-21内服、デキサメタゾン28mg day1,8,15,22内服
MM	E-Ld (3cycle目以降)	28	エムプリシティ点滴静注用	10 mg/kg	1,15	レナリドミド day1-21内服、デキサメタゾン28mg day1,15 40mg day8,22内服
MM	Kd (週2回投与) (1サイクル目)	28	カイプロリス点滴静注用	20 mg/m ²	1,2	デキサメタゾンday1,2,8,9,15,16,22,23 : 20mg内服
			カイプロリス点滴静注用	56 mg/m ²	8,9,15,16	
MM	Kd (週2回投与) (2サイクル目以降)	28	カイプロリス点滴静注用	56 mg/m ²	1,2,8,9,15,16	デキサメタゾンday1,2,8,9,15,16,22,23 : 20mg内服
MM	E-Pd (1cycle目)	28	エムプリシティ点滴静注用	10 mg/kg	1,8,15,22	ボマリドミド day1-21内服、デキサメタゾン28mg day1,8,15,22内服(75歳以下) 8mg (75歳超)
MM	E-Pd (2cycle目)	28	エムプリシティ点滴静注用	10 mg/kg	1,8,15,22	ボマリドミド day1-21内服、デキサメタゾン28mg day1,8,15,22内服 (75歳以下) 8mg (75歳超)
MM	E-Pd (3cycle目)	28	エムプリシティ点滴静注用	20 mg/kg	1	ボマリドミド併用、デキサメタゾン28mg(75歳以下)、8mg(75超) day1、40mg(75歳以下)、20mg(75超) day8,15,22
MM	E-Pd (4cycle目以降)	28	エムプリシティ点滴静注用	20 mg/kg	1	ボマリドミド併用、デキサメタゾン28mg(75歳以下)、8mg(75超) day1、40mg(75歳以下)、20mg(75超) day8,15,22
MM	Kd (週1回投与) (1サイクル目)	28	カイプロリス点滴静注用	20 mg/m ²	1	デキサメタゾン 40mg/body day1,8,15,22(day22投与は、1-9cycleまで)
			カイプロリス点滴静注用	70 mg/m ²	8,15	
MM	Kd (週1回投与) (2サイクル目以降)	28	カイプロリス点滴静注用	70 mg/m ²	1,8,15	デキサメタゾン 40mg/body day1,8,15,22(day22投与は、1-9cycleまで)
MM	IsaPD療法 (体重 : 35-60kg) (1サイクル目)	28	サークリサ点滴静注	10 mg/kg	1,8,15,22	ボマリドミド day1-21内服。レスタミン50mg内服あり。デキサメタゾン : 75歳以上は20mg/day
MM	IsaPD療法 (体重 : 35-60kg) (2サイクル目以降)	28	サークリサ点滴静注	10 mg/kg	1,15	ボマリドミド day1-21内服。レスタミン50mg内服あり。デキサメタゾン : day1,8,15,22 40mg/day 75歳以上は20mg/day
MM	IsaPD療法 (体重 : 61-85kg) (1サイクル目)	28	サークリサ点滴静注	10 mg/kg	1,8,15,22	ボマリドミド day1-21内服。レスタミン50mg内服あり。デキサメタゾン : 75歳以上は20mg/day
MM	IsaPD療法 (体重 : 61-85kg) (2サイクル目以降)	28	サークリサ点滴静注	10 mg/kg	1,15	ボマリドミド day1-21内服。レスタミン50mg内服あり。デキサメタゾン : day1,8,15,22 40mg/day 75歳以上は20mg/day
MM	DLd (1~2サイクル目) (未治療)	28	ダラキューロ配合皮下注	1800 mg/body	1,8,15,22	レナリドミド : day1-21、デキサメタゾン : 40mg/day,day1,8,15,22
MM	DLd (3~6サイクル目) (未治療)	28	ダラキューロ配合皮下注	1800 mg/body	1,15	レナリドミド : day1-21、デキサメタゾン : 40mg/day,day1,8,15,22
MM	DLd (7サイクル目以降) (未治療)	28	ダラキューロ配合皮下注	1800 mg/body	1	レナリドミド : day1-21、デキサメタゾン : 40mg/day,day1,8,15,22

がん種	レジメン名	1サイクル (日)	抗がん薬	投与量	投与日 (day)	備考
MM	DLd (1~2サイクル目) (再発、難治)	28	ダラキューロ配合皮下注	1800 mg/body	1,8,15,22	レナリドミド : day1-21、デキサメタゾン : 20mg/day,day1,2,8,9,15,16,22,23
MM	DLd (3~6サイクル目) (再発、難治)	28	ダラキューロ配合皮下注	1800 mg/body	1,15	レナリドミド : day1-21、デキサメタゾン : 20mg/day,day1,2,15,16、デキサメタゾン : 40mg/week (day8-14,day22-28)
MM	DLd (7サイクル目以降) (再発、難治)	28	ダラキューロ配合皮下注	1800 mg/body	1	レナリドミド : day1-21、デキサメタゾン : 20mg/day,day1,2、デキサメタゾン : 40mg/week (day8-14,day15-21,day22-28)
MM	DPd (1~2サイクル目)	28	ダラキューロ配合皮下注	1800 mg/body	1,8,15,22	ボマリドミド : day1-21、デキサメタゾン : 20mg/day,day1,2,8,9,15,16,22,23
MM	DPd (3~6サイクル目)	28	ダラキューロ配合皮下注	1800 mg/body	1,15	ボマリドミド : day1-21、デキサメタゾン : 20mg,day1,2,15,16、デキサメタゾン : 40mg/week (day8-14,day22-28)
MM	DPd (7サイクル目以降)	28	ダラキューロ配合皮下注	1800 mg/body	1	ボマリドミド : day1-21、デキサメタゾン : 20mg,day1,2、デキサメタゾン : 40mg/week (day8-14,day15-21,day22-28)
MM	DBd (1~3サイクル目)	21	ダラキューロ配合皮下注	1800 mg/body	1,8,15	デキサメタゾン : 20mg/day,day1,2,4,5,8,9,11,12,(15)
			ボルテゾミブ注射用 3 mg	1.3 mg/m ²	1,4,8,11	
MM	DBd (4~8サイクル目)	21	ダラキューロ配合皮下注	1800 mg/body	1	デキサメタゾン : 20mg/day,day1,2,4,5,8,9,11,12
			ボルテゾミブ注射用 3 mg	1.3 mg/m ²	1,4,8,11	
MM	DBd (9サイクル目以降)	28	ダラキューロ配合皮下注	1800 mg/body	1	デキサメタゾン : 20mg/day,day1
MM	DCd (1サイクル目)	28	ダラキューロ配合皮下注	1800 mg/body	1,8,15,22	デキサメタゾン : 20mg/day,day1,2,8,9,15,16、デキサメタゾン : 40mg/day,day22
			カイプロリス点滴静注用	20 mg/m ²	1,2	(75歳を超える場合) デキサメタゾン : 20mg/day,day1,2,8,15,22、デキサメタゾン : 8mg/day,day9,16
			カイプロリス点滴静注用	56 mg/m ²	8,9,15,16	
MM	DCd (2サイクル目)	28	ダラキューロ配合皮下注	1800 mg/body	1,8,15,22	デキサメタゾン : 20mg/day,day1,2,8,9,15,16、デキサメタゾン : 40mg/day,day22
			カイプロリス点滴静注用	56 mg/m ²	1,2,8,9,15,16	(75歳を超える場合) デキサメタゾン : 20mg/day,day1,8,15,22
MM	DCd (3-6サイクル目)	28	ダラキューロ配合皮下注	1800 mg/body	1,15	デキサメタゾン : 20mg/day,day1,2,8,9,15,16、デキサメタゾン : 40mg/day,day22
			カイプロリス点滴静注用	56 mg/m ²	1,2,8,9,15,16	(75歳を超える場合) デキサメタゾン : 20mg/day,day1,15,22、デキサメタゾン : 12mg/day,day8、デキサメタゾン : 8mg/day,day9
MM	DCd (7サイクル目以降)	28	ダラキューロ配合皮下注	1800 mg/body	1	デキサメタゾン : 20mg/day,day1,2,8,9,15,16、デキサメタゾン : 40mg/day,day22
			カイプロリス点滴静注用	56 mg/m ²	1,2,8,9,15,16	(75歳を超える場合) デキサメタゾン : 20mg/day,day1,22、デキサメタゾン : 12mg/day,day8,15、デキサメタゾン : 8mg/day,day9,16
MM	DMPB (1サイクル目)	42	ダラキューロ配合皮下注	1800 mg/body	1,8,15,22,29,36	デキサメタゾン : 20mg/day,day1,8,15,22,29,36
			ボルテゾミブ注射用 3 mg	1.3 mg/m ²	1,4,8,11,22,25,29,32	メルカプトリン : 9mg/m ² /day,day1-4,PSL 60mg/m ² /day,day2-4
MM	DMPB (2~9サイクル目)	42	ダラキューロ配合皮下注	1800 mg/body	1,22	デキサメタゾン : 20mg/day,day1,22
			ボルテゾミブ注射用 3 mg	1.3 mg/m ²	1,8,22,29	メルカプトリン : 9mg/m ² /day,day1-4,PSL 60mg/m ² /day,day2-4
MM	DMPB (10サイクル目以降)	28	ダラキューロ配合皮下注	1800 mg/body	1	デキサメタゾン : 20mg/day,day1
MM	IsaKd (1サイクル目)	28	サークリサ点滴静注	10 mg/kg	1,8,15,22	デキサメタゾン : 20mg/day (day1,2,8,9,15,16,22,23)
			カイプロリス点滴静注用	20 mg/m ²	1,2	
			カイプロリス点滴静注用	56 mg/m ²	8,9,15,16	
MM	IsaKd (2サイクル目以降)	28	サークリサ点滴静注	10 mg/kg	1,15	デキサメタゾン : 20mg/day (day1,2,8,9,15,16,22,23)
			カイプロリス点滴静注用	56 mg/m ²	1,2,8,9,15,16	
MM	Isa単独 (1サイクル目)	28	サークリサ点滴静注	20 mg/kg	1,8,15,22	
MM	Isa単独 (2サイクル目以降)	28	サークリサ点滴静注	20 mg/kg	1,15	
MM	Isa + d (1サイクル目)	28	サークリサ点滴静注	20 mg/kg	1,8,15,22	デキサメタゾン : 40mg/day (day1,8,15,22)
MM	Isa + d (2サイクル目以降)	28	サークリサ点滴静注	20 mg/kg	1,15	デキサメタゾン : 40mg/day (day1,8,15,22)
MM	VRd	21	ボルテゾミブ注射用 3 mg	1.3 mg/m ²	1,4,8,11	レナリドミド 25mg/day:day1-14 デキサメタゾン : 20mg/day,day1,2,4,5,8,9,11,12

がん種	レジメン名	1サイクル (日)	抗がん薬	投与量	投与日 (day)	備考
MM	VRd-lite(1-9サイクル目)	35	ボルテゾミブ注射用 3 mg	1.3 mg/m ²	1,8,15,22	レナリドミド 15mg/day:day1-21 デキサメタゾン : 20mg/day,day1,2,8,9,15,16,22,23 (75歳以下) デキサメタゾン : 20mg/day,day1,8,15,22 (75歳超)
MM	VRd-lite(10-15サイクル目)	35	ボルテゾミブ注射用 3 mg	1.3 mg/m ²	1,15	レナリドミド 15mg/day:day1-21
MM	VPd療法 (1~8サイクル目)	21	ボルテゾミブ注射用 3 mg	1.3 mg/m ²	8	ボマリドミド day1-14 デキサメタゾン : day1,2,4,5,8,9,11,12
MM	VPd療法 (9サイクル目以降)	21	ボルテゾミブ注射用 3 mg	1.3 mg/m ²	1,8	ボマリドミド day1-14 デキサメタゾン : day1,2,8,9
HL	ABVd	28	ダカルバジン注	250 mg/m ²	1,15	
			ドキシソルビン塩酸塩注	25 mg/m ²	1,15	
			エクザール注	6 mg/m ²	1,15	
			プレオ注	10 mg/m ²	1,15	
HL	ABVD	28	ダカルバジン注	375 mg/m ²	1,15	
			ドキシソルビン塩酸塩注	25 mg/m ²	1,15	
			エクザール注	6 mg/m ²	1,15	
			プレオ注	10 mg/m ²	1,15	
HL	Brentuximab Vedotin	21	アドセトリス点滴静注	1.8 mg/kg	1	
HL	Pembrolizumab (3週毎)	21	キイトルーダ点滴静注	200 mg/Body	1	
HL	BV+AVD	28	ダカルバジン注	375 mg/m ²	1,15	
			ドキシソルビン塩酸塩注	25 mg/m ²	1,15	
			エクザール注	6 mg/m ²	1,15	
			アドセトリス点滴静注	1.2 mg/kg	1,15	
HL	Pembrolizumab (倍量、6週毎)	42	キイトルーダ点滴静注	400 mg/Body	1	
NHL	ACES	21	エトポシド点滴静注	80 mg/m ²	1,2,3,4	
			カルボプラチン点滴静注	100 mg/m ²	1,2,3,4	
			シタラピン点滴静注液	2000 mg/m ²	5	
NHL	CHOP	21	エンドキサン注	750 mg/m ²	1	フレドニゾン100mg/body 経口 d2~5
			ドキシソルビン塩酸塩注	50 mg/m ²	1	
			オンコピン注	1.4 mg/m ²	1	
NHL	CHOP変法	21	エンドキサン注	750 mg/m ²	1	フレドニゾン 40mg/body 経口 day2-5
			ドキシソルビン塩酸塩注	50 mg/m ²	1	
			フィルデシン注	0.06 mg/kg	1	
NHL	RF	42	リツキシマブBS点滴静注	375 mg/m ²	1	フルダラピン 40mg/m ² 経口 day2-6まで。
NHL	R-CHOP	21	リツキシマブBS点滴静注	375 mg/m ²	1	フレドニゾン 100mg/day 経口 day2-5
			エンドキサン注	750 mg/m ²	1	
			ドキシソルビン塩酸塩注	50 mg/m ²	1	
			オンコピン注	1.4 mg/m ²	1	
NHL	R-FCM (内服)	42	リツキシマブBS点滴静注	375 mg/m ²	1	フルダラピン 40mg/m ² 、シクロホスファミド 200mg/m ² 経口 day1-3
			ノバントロン注	8 mg/m ²	1	
NHL	R-FCM	42	リツキシマブBS点滴静注	375 mg/m ²	1	
			ノバントロン注	8 mg/m ²	1	
			エンドキサン注	200 mg/m ²	1,2,3	
			フルダラ静注用	25 mg/m ²	1,2,3	
NHL	R-THP-COP (若年者向け)	21	リツキシマブBS点滴静注	375 mg/m ²	1	フレドニゾン 100mg/body 経口 day2-5
			エンドキサン注	750 mg/m ²	1	
			ピルビン注射用	50 mg/m ²	1	
			オンコピン注	1.4 mg/m ²	1	

がん種	レジメン名	1サイクル (日)	抗がん薬	投与量	投与日 (day)	備考
NHL	R-THP-COP	21	リツキシマブBS点滴静注	375 mg/m ²	1	プレドニゾン 40mg/body 経口 day2-5
			エンドキサン注	500 mg/m ²	1	
			ピルビン注射用	30 mg/m ²	1	
			オンコビン注	1 mg/m ²	1	
NHL	THP-COP	21	エンドキサン注	500 mg/m ²	1	プレドニゾン 40mg/body 経口 day2-5
			ピルビン注射用	30 mg/m ²	1	
			オンコビン注	1 mg/m ²	1	
NHL	THP-COP変法	21	エンドキサン注	500 mg/m ²	1	プレドニゾン 40mg/body 経口 day2-5
			ピルビン注射用	30 mg/m ²	1	
			フィルデシン注	0.06 mg/kg	1	
NHL	Bendamustine	28	トリアキシン点滴静注液	90 mg/m ²	1,2	
NHL	R-CHOP変法	21	リツキシマブBS点滴静注	375 mg/m ²	1	プレドニゾン 40mg/day 経口 day2-5
			エンドキサン注	750 mg/m ²	1	
			ドキソルピシン塩酸塩注	50 mg/m ²	1	
			フィルデシン注	0.06 mg/kg	1	
NHL	R-Bendamustine	28	リツキシマブBS点滴静注	375 mg/m ²	1	
			トリアキシン点滴静注液	90 mg/m ²	1,2	
NHL	VR-CAP	21	ボルテゾミブ注射用 3 mg	1.3 mg/m ²	1,4,8,11	プレドニゾン 100mg/body 経口 day2-5
			エンドキサン注	750 mg/m ²	1	
			ドキソルピシン塩酸塩注	50 mg/m ²	1	
NHL	Rituximab	28	リツキシマブBS点滴静注	375 mg/m ²	1	
NHL	GCD	21	ゲムシタピン点滴静注	1000 mg/m ²	1,8	デキサメタゾン day1-4 40mg
			カルボプラチン点滴静注	AUC 4~6	1	
NHL	Rituximab (Weekly)	28	リツキシマブBS点滴静注	375 mg/m ²	1,8,15,22	
NHL	CHOEP	21	エトポシド点滴静注	100 mg/m ²	1,2,3	プレドニゾン100mg/body d1~5
			エンドキサン注	750 mg/m ²	1	
			ドキソルピシン塩酸塩注	50 mg/m ²	1	
			オンコビン注	2 mg/Body	1	
NHL	THP-COP (若年者)	21	エンドキサン注	750 mg/m ²	1	プレドニゾン 100mg/body 経口 day2-5
			ピルビン注射用	50 mg/m ²	1	
			オンコビン注	1.4 mg/m ²	1	
NHL	Brentuximab Vedotin	21	アドセトリス点滴静注	1.8 mg/kg	1	
NHL	Pralatrexate	49	ジフォルクタ注射液	30 mg/m ²	1,8,15,22,29,36	
NHL	Obinutuzumab (導入療法1サイクル目)	21	ガザイバ点滴静注	1000 mg/Body	1,8,15	
NHL	Obinutuzumab (導入療法2サイクル目以降)	21	ガザイバ点滴静注	1000 mg/Body	1	
NHL	Obinutuzumab (維持療法)	56	ガザイバ点滴静注	1000 mg/Body	1	
NHL	BV + CHP	21	エンドキサン注	750 mg/m ²	1	プレドニゾン 100mg/day 経口 day2-5
			ドキソルピシン塩酸塩注	50 mg/m ²	1	
			アドセトリス点滴静注	1.8 mg/kg	1	
NHL	G-Bendamustine (導入療法1サイクル目)	28	ガザイバ点滴静注	1000 mg/Body	1,8,15	
			トリアキシン点滴静注液	90 mg/m ²	1,2	
NHL	G-Bendamustine (導入療法2-6サイクル目)	28	ガザイバ点滴静注	1000 mg/Body	1	
			トリアキシン点滴静注液	90 mg/m ²	1,2	
NHL	CPT-11	35	カンプト点滴静注	40 mg/m ²	1,2,3,8,9,10,15,16,	
NHL	Romidepsin	28	イストダックス点滴静注用	14 mg/m ²	1,8,15	
NHL	Nelarabine	21	アラノンジ-静注用	1500 mg/m ²	1,3,5	

がん種	レジメン名	1サイクル (日)	抗がん薬	投与量	投与日 (day)	備考
NHL	Pola + BR (1サイクル目)	21	リツキシマブBS点滴静注	375 mg/m ²	1	
			ボライビ-点滴静注	1.8 mg/kg	2	
			トレアキシ点点滴静注液	90 mg/m ²	2,3	
NHL	Pola + BR (2サイクル目以降、Rit90分投与)	21	リツキシマブBS点滴静注	375 mg/m ²	1	
			ボライビ-点滴静注	1.8 mg/kg	1	
			トレアキシ点点滴静注液	90 mg/m ²	1,2	
NHL	R2 (1サイクル目)	28	リツキシマブBS点滴静注	375 mg/m ²	1,8,15,22	レナリドミド : 20mg/day day1-21
NHL	R2 (2-5サイクル目)	28	リツキシマブBS点滴静注	375 mg/m ²	1	レナリドミド : 20mg/day day1-21
NHL	Pola + R-CHP (1サイクル目)	21	リツキシマブBS点滴静注	375 mg/m ²	1	プレドニゾン 100mg/day 経口 day3-6
			ボライビ-点滴静注	1.8 mg/kg	2	
			エンドキサン注	750 mg/m ²	2	
			ドキシルピシン塩酸塩注	50 mg/m ²	2	
NHL	Pola + R-CHP (2-6サイクル目、Rit90分投与)	21	リツキシマブBS点滴静注	375 mg/m ²	1	プレドニゾン 100mg/day 経口 day2-5
			ボライビ-点滴静注	1.8 mg/kg	1	
			エンドキサン注	750 mg/m ²	1	
			ドキシルピシン塩酸塩注	50 mg/m ²	1	
NHL	Pola + R-CHP (7-8サイクル目、Rit90分投与のみ)	21	リツキシマブBS点滴静注	375 mg/m ²	1	
ITP	Rituximab	28	リツキシマブBS点滴静注	375 mg/m ²	1,8,15,22	
MDS	Azacitidine (皮下注)	28	ビダーザ注射用	75 mg/m ²	1,2,3,4,5,6,7	
MDS	Azacitidine (静注)	28	ビダーザ注射用	75 mg/m ²	1,2,3,4,5,6,7	
アミロイドーシス	DCyBorD (1~2サイクル目)	28	ダラキューロ配合皮下注	1800 mg/body	1,8,15,22	デキサメタゾン : 20mg po day2,9,16,23。レスタミン50mg内服あり。
			エンドキサン注	300 mg/m ²	1,8,15,22	
			ボルテゾミブ注射用 3 mg	1.3 mg/m ²	1,8,15,22	
アミロイドーシス	DCyBorD (3~6サイクル目)	28	ダラキューロ配合皮下注	1800 mg/body	1,15	デキサメタゾン : 20mg po day2,16
			エンドキサン注	300 mg/m ²	1,8,15,22	
			ボルテゾミブ注射用 3 mg	1.3 mg/m ²	1,8,15,22	
アミロイドーシス	DCyBorD (7サイクル目以降)	28	ダラキューロ配合皮下注	1800 mg/body	1,15	デキサメタゾン : 20mg po day2,16
原発不明癌	Nivolumab (2週毎)	14	オブジーボ点滴静注	240 mg/Body	1	デキサメタゾン : 20mg po day1
原発不明癌	Nivolumab (倍量、4週毎)	28	オブジーボ点滴静注	480 mg/Body	1	