保険薬局様へ　　この用紙は当院薬剤部までFAXしてください

服薬情報提供書 （サルタノールインヘラーチェックシート）

Ver.20190520

担当医　　科　　先生

＊確認した項目について、その評価を確認欄に○△×にてご記入いただき、適宜コメント等記載のうえ、当院薬剤部までFAXしてください。

京都第二赤十字病院薬剤部　直通TEL：075(212)6940　FAX：075(212)6113

問題なし：○　やや不安あり：△　不安あり：×			確認（○△×）
アドヒアランス	1	発作時の吸入回数を理解している（成人1回2吸入、小児1回1吸入、最大1日4回まで）	
	2	吸入後、効果が持続する3時間は追加吸入を行わないことを理解している	
準備	3	噴霧回数チェックシールで残量を確認する	
	4	吸入口のキャップをはずし、アルミ缶の底が上になるように持つ （人差し指をアルミ缶、親指をアダプターの底にあてはさむように持つ）	
	5	吸入口のキャップをはずし、ボンベの中の薬が均一にまじりあうようによく振る	
吸入	6	【息吐き】無理をしない程度に、2～3秒ほど息を吐きだす ＊マウスピースに息を吹きかけない	
	7	【吸入】以下の①②いずれかの方法で吸入する ①吸入口をくわえないで口から4cmほど離し、息をゆっくり吸い込みながら、ボンベの底を強く1回押して吸入する ②吸入口を唇または歯で軽くくわえて、息をゆっくり吸い込みながら、ボンベの底を強く1回押して吸入する ＊①または②のいずれかは医師の指示に従う	
	8	【息止め】マウスピースから口を離し、口を閉じて3～4秒間息を止める	
	9	【息吐き】ゆっくり息を吐きだし、元の呼吸に戻す ＊マウスピースに息を吹きかけない	
うがい	10	【吸入後】うがい、または口すすぎをおこなう	
保管と管理	11	吸入後は、アダプターにキャップをつけて30℃未満の場所で清潔に保管する ＊アダプターは少なくとも週1回以上は流水か温湯でよく洗い、十分に乾燥させる ＊洗った直後に使用する必要が生じた場合は水分をよく切ってからボンベを装着し空気中に数回空噴射して噴射を確認してから使用する→使用後は再度洗い乾燥させる ＊ボンベは絶対に濡らしたり火中に入れたりしない ＊ボンベに穴を開けるときは空にしてから開ける ＊使用後は地方自治体により定められたボンベの廃棄処理法に従う	

【確認日】　　年　　月　　日　　【服薬情報提供に関する患者の同意】　☐ あり　☐ なし

【患者ID】　　【保険薬局名（TEL）・担当薬剤師】

【患者名】　　様

【初回処方日】　　年　　月　　日

【確認回数】　初回 ・ 2回目 ・ 3回目 ・ （　　）回目

【コメント】