

保険薬局様へ

この用紙は当院薬剤部までFAXしてください

服薬情報提供書 (テリボン^{皮下注オートインジェクター}自己注射チェックシート)

Ver.20200407

担当医

科

先生

* 確認した項目について、その評価を確認欄に○△×にてご記入いただき、適宜コメント等記載のうえ、当院薬剤部までFAXしてください。

京都第二赤十字病院薬剤部 直通TEL:075(212)6940 FAX:075(212)6113

		問題なし:○	やや不安あり:△	不安あり:×	確認 (○△×)
アドヒアランス	1	用法・用量を正しく理解している (用法・用量:)			
	2	用法・用量を守って注射している			
準備	3	冷蔵庫から取り出し、包装を開封せずに20分置き、室温に戻す			
注射	4	注射する場所を正しく選ぶことができる(腹部、大腿部、上腕部) * 前回注射したところから3cm以上離す * 皮膚が赤くなっていたり、傷があったり、硬くなっている場所には注射しない * へその周り5cmには注射しない ※上腕部に注射するときは、介護者等が注射する			
	5	注射する場所をアルコール消毒綿で消毒する			
	6	注射をする * キャップを外し、針カバーの面を皮膚に直角に当て、「カチッ」と音がするまでしっかり押し当てる			
	7	注射器を抜く * 2回目の「カチッ」の音で薬液の注入は終了、皮膚からの液もれを防ぐため、5秒以上数えて皮膚から離す * 薬液確認窓全体がオレンジ色になっていることを確認			
	8	注射部位をアルコール綿で10秒間ほど押さえる(もまない)			
廃棄	9	キャップをせずに専用の廃棄袋に廃棄する(キャップは家庭ゴミとして廃棄可) * 後日まとめて医療機関に持参する			
保管と管理	10	使用前は包装を開封せずに冷蔵庫で保管する(凍結させないように注意)			

【確認日】 年 月 日 【服薬情報提供に関する患者の同意】 あり なし

【患者ID】 【保険薬局名(TEL)・担当薬剤師】

【患者名】 様

【確認回数】 初回 ・ 2回目 ・ 3回目 ・ ()回目

【コメント】