

外来抗菌薬 フォーミュラリ

外来抗菌薬（市中肺炎）

Ver.2.0 2026年04月


HP用

* 非定型肺炎の鑑別項目


- 1) 年齢60歳未満
- 2) 基礎疾患がない、あるいは軽微
- 3) 頑固な咳がある
- 4) 胸部聴診上所見が乏しい
- 5) 痰がない、あるいは迅速診断法で原因菌が証明されない
- 6) 末梢血白血球が10,000/ μ L未満

4項目以上合致：非定型肺炎
3項目以下合致：細菌性肺炎

成人の場合



※ガレノキサシンは他のレスピラトリーキノロンでの代替え可。
主に緑膿菌に対して使用。また、結核は必ず除外する。



内服薬

第一推奨薬：

セファクロル

第二推奨薬：

アモキシシリン／クラブラン酸

＋アモキシシリン

注射薬

推奨薬：セフトリアキソン

表1. 抗菌薬の用法用量など一覧（腎機能正常時）

一般名	規格	商品名（後発品）	商品名（先発品）	用法用量	後発品の コスト (円/日)	先発品の コスト (円/日)
アモキシシリン/ クラブラン酸	250mg	—	オーグメンチン 錠	1回1錠 1日3回	—	137.1
アモキシシリン	250mg	アモキシシリン カプセル	サワシリン カプセル	1回1カプセル 1日3回	33.6	45.9
セファクロル	250mg	セファクロル カプセル	ケフラール カプセル	1回1カプセル 1日3回	164.1	164.1
クラリスロマイシン	200mg	クラリスロマイシン錠	クラリシッド錠	1回1錠 1日2回	45.6	43.2
アジスロマイシン	250mg	アジスロマイシン錠	ジスロマック錠	1回2錠 1日1回	112.6	230
ガレノキサシン	200mg	—	ジェニナック錠	1回2錠 1日1回	—	269
レボフロキサシン	500mg	レボフロキサシン錠	クラビット錠	1回1錠 1日1回	60.8	91.8
ホスホマイシン	500mg	ホスホマイシン カルシウムカプセル	ホスミン錠	1回2錠 1日3回	—	528

表2. 腎機能に応じた投与量の調整

商品名	規格	用法用量	クレアチンクリアランス (Ccr)		
			$50 \leq Ccr$	$10 \leq Ccr < 50$	$Ccr < 10$
アモキシシリン/ クラバン酸	250 mg	1回量	1錠	1錠	1錠
		1日回数	3回	2回	1回
アモキシシリン	250 mg	1回量	1カプセル	1カプセル	1カプセル
		1日回数	3回	2回	1回
セファクロル	250 mg	1回量	1カプセル	1カプセル	1カプセル
		1日回数	3回	3回	2回
クラリスロマイシ ン	200 mg	1回量	1錠	1錠	1錠
		1日回数	2回	2回	2回
アジスロマイシン	250 mg	1回量	2錠	2錠	2錠
		1日回数	1回	1回	1回
ガレノキサシン	200 mg	1回量	2錠	$Ccr < 30$ かつ体重が 40kg 未満であれば 1回1錠に減量	
		1日回数	1回		
レボフロキサシン	500 mg	1回量	1錠	$20 \leq Ccr < 50$: 初日1錠、2日目以降0.5錠 $Ccr < 20$: 初日1錠、2日目スキップ、3日目以降2日 おきに0.5錠	
		1日回数	1回		
ホスホマイシン	500 mg	1回量	2錠	2錠	2錠
		1日回数	3回	3回	2回

Ver.1.0	2022年12月	初版
Ver.1.1	2025年01月	薬価改訂を反映
Ver.1.2	2026年03月	薬価改訂を反映
Ver.2.0	2026年04月	ホームページ公開用にあわせて レイアウトを変更

参考文献

<外来抗菌薬（市中肺炎）>

1. 成人肺炎診療ガイドライン2017. 日本呼吸器学会
2. JAID/JSC感染症治療ガイド2019. 日本感染症学会・日本化学療法学会
3. サンフォード感染症治療ガイド2018.
4. 各薬剤インタビューフォーム
5. 保険薬事典Plus+ 令和4年4月版. じほう. 2022.

参考文献

<外来抗菌薬（膀胱炎、蜂窩織炎）>

1. JAID/JSC感染症治療ガイド2019. 日本感染症学会・日本化学療法学会
2. サンフォード感染症治療ガイド2018.
3. 各薬剤インタビューフォーム
4. 保険薬事典Plus+ 令和4年4月版. じほう. 2022.